

Brut – Fehler erkennen und beheben.

Feststellung	Mögliche Ursachen	Behebung	
1. Unbefruchtete Eier	nicht befruchtet	Zuchtfähigen Hahn zu maximal sechs Hühnern	
	überlagert	Eier mehrmals einsammeln, rasch abkühlen und nicht über 10 Tage lagern.	
	Zuchttiere über oder unterernährt	Vielseitige Ernährung der Elterntiere (Keimfutter), auf Endo- und Ektoparasiten kontrollieren.	
2. Abgestandene Eier	zu hohe Bruttemperatur	Thermometer überprüfen, Bruttemperatur überwachen, Wärme und Kühleinwirkung von außen vermeiden	
	zu niedrige Lagertemperatur	Bruteier zwischen 10 und 15°C lagern	
	ungenügendes Wenden	Wendeautomatik kontrollieren	
	krankte Elterntiere	Zuchttierbestand kontrollieren	
3. Voll entwickelte Küken in der Schale	ungenügendes Wenden	Wendeautomatik kontrollieren	
	erbliche Fehler	Bei der Auswahl der Zuchttiere auf gute Schlupffähigk. achten	
	falsche Bruttemperatur	siehe 2.	
4. Küken stecken geblieben	zu niedrige Feuchtigkeit	Hygrometer überwachen	
	zu niedrige Bruttemperatur	Bruttemperatur überwachen	
5. Geschlüpfte Küken Schlupfschäden (von a h)			
	a) Verklebte Küken	ungenügende Feuchtigkeit während des Schlupfes	Luftfeuchtigkeit während des Schlupfes erhöhen
	b) Verschmierte, große weiche Küken	Zu feucht gebrütet, Frischemangel, zu trocken während der Vorbrut.	weniger Feuchtigkeit, Lüftung erhöhen, Abkühlung u. Luftfeuchtigkeit überwachen.
		zu niedrige Bruttemperatur	Thermometer überprüfen u. Bruttemperatur überwachen
	c) Eidotter nicht eingezogen, kurzer Flaum	Zu hohe Bruttemperatur bzw. zu große Temperaturschwankungen.	Siehe 5.b)

	zu trocken gebrütet.	Feuchtigkeitsmesser kontrollieren und gegeben falls warten
d) Zu kleine Küken	zu kleine Bruteier	Bruteiergewicht kontrollieren
	zu warm bzw. zu trocken gebrütet	Bruttemperatur u. Feuchtigkeit überwachen
e) Küken tot in der Schlupfhorde	Nabelinfektion durch verschiedene Krankheitserreger	Desinfektion des Brutgerätes insbesondere während des Schlupfes
f) Früh- bzw. Spätschlupf der Küken blutiger Nabel	Zu hohe bzw. zu niedrige Bruttemperatur	Thermometer überprüfen u. Bruttemperatur überwachen
g) Missbildungen: Kreuzschnabel, fehlende Augen	Elterntiere mit Fehlern in der Erbmasse	Zuchttierbestand neu überprüfen (selektieren)
h) verkrümmte Zehen	Bruttemperaturfehler	Thermometer überprüfen und Bruttemperatur überwachen